

儿科指标变量解释说明

“新生儿院内尿布皮炎发生例次数”解释说明：

定义：统计周期内新生儿入院后新发生的尿布皮炎的例次数。

发生院内尿布皮炎的新生儿如果从一个科室转入另一个科室，应由原科室计为1例；同一新生儿一次住院期间发生多部位尿布皮炎，以发生部位数计算例次，如出现分期加重或发生1次痊愈后的再发生应再计算为1例次新发；院外带入尿布皮炎，若分期加重或有新发部位也计为1例次新发。

尿布皮炎是指在尿布或尿垫下，由于皮肤暴露于潮湿环境中或与念珠菌(Candida)接触而引起的皮肤炎症变化。常见于新生儿纸尿裤覆盖区域，表现为肛门附近、臀部或会阴部等处皮肤出现肿胀、散在红疹或红斑，严重者可导致患处皮肤糜烂、溃破及渗液，甚至发生败血症。

包含：住院新生儿入院后发生的符合尿布皮炎诊断的例次数。

排除：入院前已发生且分期未加重的尿布皮炎；母婴同室新生儿。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。

“住院新生儿实际占用床日数”解释说明

定义：统计期间病区每天凌晨0点住院新生儿实际占用的床日数总和。统计新生儿时以入院时为出生≤28天为准。

包含：入院时为出生≤28天的新生儿实际占用的床日数。

排除：母婴同室新生儿。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。

“新生儿中度及以上院内尿布皮炎发生例次数”解释说明：

定义：统计周期内，新生儿入院后新发生的中度及以上分期的尿布皮炎的例次数。同一新生儿一次住院期间，若轻度尿布皮炎分期加重至中度或重度计为1例次。院外带入尿布皮炎，若分期加重至中度或重度也计为1例次。

尿布皮炎可划分为轻、中、重三级。

轻度：皮肤红疹或红斑，没有破损

中度：皮肤红疹，有轻微破损

重度：皮肤红疹，有大面积破损或溃疡（不是压力性损伤）。如伴有念珠菌感染可见鲜明的红色卫星状损伤/脓疮，可能扩展到腹股沟或皮肤褶皱处。

包含：新生儿中度院内尿布皮炎发生例次数，新生儿重度院内尿布皮炎发生例次数。

排除：新生儿轻度院内尿布皮炎发生例次数。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。

“患儿外周静脉输液渗出/外渗发生例次数”解释说明

定义：统计周期内，患儿在住院期间发生外周静脉输液渗出例次数和外渗例次数之和。统计患儿外周静脉输液渗出/外渗发生例次数时，同一住院患儿在 24 小时内发生多次外周静脉输液渗出/外渗，则累加计算相应的次数。

渗出是指在外周静脉输液过程中，非腐蚀性药液进入静脉管腔以外的周围组织。

外渗是指在外周静脉输液过程中，腐蚀性药液进入静脉管腔以外的周围组织。

包含：住院患儿使用一次性钢针、留置针等外周静脉置管输液发生渗出及外渗的例次数；住院患儿为接受辅助检查做准备而临时置入、检查后即拔除的留置针输液发生渗出及外渗的例次数。

排除：外周静脉置管以外的置管（如动脉置管、中心静脉置管）输液发生渗出及外渗的例次数。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。

附表格：儿童外周静脉外渗/渗出分级表

级别	特征
0级	无症状，容易冲管
1级	局部肿（1%~10%）；冲管困难；疼痛
2级	局部轻度肿胀：肿胀范围达到该穿刺肢体总长度的1/4或10%~25%；皮肤红；疼痛
3级	局部中度肿胀：肿胀范围达到该穿刺肢体总长度的1/4~1/2或25%~50%；疼痛；皮肤触冷苍白；远端脉搏弱
4级	局部重度肿胀：肿胀范围达到该穿刺肢体总长度的1/2或50%以上；血制品、刺激性和/或发泡剂（任何剂量的渗出）；皮肤触冷苍白；皮肤破溃/坏死；水疱；脉搏减弱或消失；疼痛；毛细血管充盈时间>4秒

“患儿外周静脉通路留置总日数”解释说明

定义：统计周期内患儿在住院期间留置外周静脉通路的日数之和，外周静脉留置针每跨越一个固定时点（如中午 12 点）一次计作一日；当天置入并拔除也计作 1 日。

统计时，带管入科（包括入院或从其他科室转入）患儿以入科当日算起，带管转科患儿以转科日期为止；若同一住院患儿留置多条外周静脉通路则应计算每一条通路相应的留置日数。

包含：住院患儿留置一次性钢针、留置针等外周静脉置管的总日数；住院患儿为接受辅助检查做准备而临时置入、检查后即拔除的留置针留置日数。

排除：外周静脉置管以外的置管（如动脉置管、中心静脉置管）留置的日数。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。

“患儿外周静脉输液外渗发生例次数”解释说明

定义：统计周期内，患儿住院期间外周静脉输液过程中，药物外渗发生的例次数。

包含：住院患儿使用一次性钢针、留置针等外周静脉置管输液发生外渗的例次数。住院患儿为接受辅助检查做准备而临时置入、检查后即拔除的留置针输液发生外渗的例次数。

排除：外周静脉置管以外的置管（如动脉置管、中心静脉置管）输液发生外渗的例次数。

所有住院患儿使用一次性钢针、留置针等外周静脉置管输液发生渗出的例次数。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。

“出院患儿中持续母乳喂养的 6 月龄内患儿数”解释说明

定义：统计周期内出院患儿中，入院和出院时皆为母乳喂养的 6 月龄内患儿数，包括出院当时未能实现母乳喂养、但评估确定回家后能实现母乳喂养（患儿无母乳喂养禁忌证、母亲有泌乳功能且有喂养意愿）的患儿。统计时以入院时的月龄≤6 月为准。

包含：纯母乳喂养、混合喂养的 6 月龄内患儿（含新生儿）。

排除：母婴同室新生儿。捐赠母乳喂养患儿。明确禁止母乳喂养的疾病患儿，母亲疾病或用药禁止母乳喂养的患儿。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。

“出院患儿中入院时为母乳喂养的6月龄内患儿数”解释说明

定义：统计周期内的出院患儿中，入院时月龄 ≤ 6 月且母乳喂养的患儿数。新生儿入院时无论是否母乳喂养（除明确禁止母乳喂养）均应纳入分母。统计时以入院时的月龄 ≤ 6 月为准。

包含：纯母乳喂养、混合喂养的6月龄内患儿。所有住院新生儿（除明确禁止母乳喂养）。

排除：母婴同室新生儿。捐赠母乳喂养患儿。明确禁止母乳喂养的疾病患儿，母亲疾病或用药禁止母乳喂养的患儿。

备注：如医院未开设儿科，填-2；如医院开设有儿科，但数据采集困难，填-1。